

HALVETIC

Herbicīds

Darbīgā viela: glifosāts - 180 g/l (14,83 %)

Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts

Reģistrācijas Nr.: 0803

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 20 x 0.5L, 12 x 1L, 4 x 3L, 4 x 5L, 2 x 10L,

Partijas No. skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma

H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH 401	Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
P280	Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus / sejas aizsargus.
P501	Atbrīvoties no tvertnes/satura, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
SP1	Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3	Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
SPe3	Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei preparāta devai, sākot ar 4.0 l/ha līdz 6.0 l/ha. Aizsargjosla nav jāievēro, ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.
Spe4	Lai aizsargātu ūdens organismus un ar lietojumu nesaistītus augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz necaurīdīgas virsmas, piemēram, asfalta, cementa plātnēm, bruģa un citās vietās ar augstu noteces risku.

Preparātu nedrīkst lietot teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta- telefons 112.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polija

Tel.: +48(017)24 07 111, Fax: +48(017)24 07 122, e-pasts:sarzyna@ciechgroup.com

Preparāta importētājs un izplatītājs Latvijā:

SIA Baltic Agro, Bauskas iela 58A-13, Rīga LV-1004, Latvija Phone + 371 67228851,

www.balticagro.lv

SIA "Scandagra Latvia", Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Phone: +371 25443839

info@scandagra.lv

Agrimatco Latvia SIA, Rīga, Tīraines iela 5c, Latvija, Tel. 29106592 / 67807712
agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com

SIA Linas Agro, Baltijas Ceļš, Brankas, Cenu district, Jelgavas region, Latvia, LV3043
info@linasagro.lv , +371 63084024

LPKS LATRAPPS, Lietuvas iela 16A, Eleja, Elejas pagasts, LV-3023, Latvia,
Tālr. +371 6302 5898; latraps@latraps.lv

Uzglabāšana

Uzglabāt oriģinālos iepakojumos, tā, lai novērstu saskari ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību, vides piesārņojumu un trešo personu piekļuvi. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +30°C

Derīguma termiņš - 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā.

HALVETIC

Herbicīds

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai pirms kukurūzas sējas vai pirms sadīgšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, ābeļu un bumbieru stādījumos, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās/industriālās teritorijās

Darbīgā viela: glifosāts - 180 g/l (14,83 %)

Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts

Reģistrācijas Nr.: 0803

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 0.5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l, 120 l, 200 l, 1000 l

Partijas No. skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma

- | | |
|----------------|--|
| H412 | Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |
| EUH 401 | Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. |
| P280 | Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus / sejas aizsargus. |
| P501 | Atbrīvoties no tvertnes/satura, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības |
| SP1 | Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstīlpu un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. |
| SPe3 | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstīlpēm un ūdenstecēm. |
| SPe3 | Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei preparāta devai, sākot ar 4.0 l/ha līdz 6.0 l/ha. Aizsargjosla nav jāievēro, ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas. |
| Spe4 | Lai aizsargātu ūdens organismus un ar lietojumu nesaistītus augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz necaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta, cementa plātnēm, bruģa un citās vietās ar augstu noteces risku. |

Preparātu nedrīkst lietot teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta- telefons 112.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polija

Tel.: +48(017)24 07 111, Fax: +48(017)24 07 122, e-pasts:sarzyna@ciechgroup.com

Preparāta importētājs un izplatītājs Latvijā:

SIA Baltic Agro, Bauskas iela 58A-13, Rīga LV-1004, Latvija Phone + 371 67228851,
www.balticagro.lv

SIA "Scandagra Latvia", Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Phone: +371 25443839
info@scandagra.lv

Agrimatco Latvia SIA, Rīga, Tīraines iela 5c, Latvija, Tel. 29106592 / 67807712
agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com

SIA Linas Agro, Baltijas Ceļš, Brankas, Cenu district, Jelgavas region, Latvia, LV3043
info@linasagro.lv , +371 63084024

LPKS LATRAPs, Lietuvas iela 16A, Eleja, Elejas pagasts, LV-3023, Latvia,
Tālr. +371 6302 5898; latraps@latraps.lv

Uzglabāšana

Uzglabāt oriģinālos iepakojumos, tā, lai novērstu saskari ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību, vides piesārņojumu un trešo personu piekļuvi. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +30°C

Derīguma termiņš - 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saīdēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA.

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar līdzekli, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi:

a) Acu vai sejas aizsardzība

Izmantot aizsargbrilles un sejas aizsardzību.

b) Ādas aizsardzība

Roku aizsardzība

Valkāiet piemērotus cimdus (no neoprēna, butila vai gumijas ar minimālo biezumu 0,4 mm), kas pārbaudīti saskaņā ar EN 374.

Kermeņa aizsardzība

Izmantot veicamajiem darbiem atbilstošus aizsargapģērbus un aizsargapavus. Piesārņoto apģērbu sistemātiski mazgāt.

c) Elpošanas ceļu aizsardzība

Ja darba vietā ir laba ventilācija, individuālā elpošanas ceļu aizsardzība nav nepieciešama.

Citos gadījumos izmantojiet pusmaskas vai maskas ar filtriem, lai absorbētu organisko savienojumu tvaikus.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

HALVETIC – Vispārējs, sistēmas iedarbības herbicīds, ko izmanto uz lapām, ūdens šķīduma koncentrāta formā (SL).

Saskaņā ar HRAC klasifikāciju darbīgā viela glifosāts pieder G grupai.

Preparāts satur aktīvo vielu, kas bloķē enzīma 5-enolpiruvil-šikimāt-3-fosfāta sintēzes (EPSPS) darbību, kas ir galvenais enzīms šikimīnskābes vielmaiņas ceļā, kas saistīts ar aromātisko aminoskābju biosintēzi, un tādējādi kavē augu augšanai nepieciešamo proteīnu sintēzi.

Tas iekļūst caur auga zaļajām virszemes daļām (lapas, zaļi dzinumi un nepārkoksnējusies miza), pēc tam pārvietojas visā augā un sasniedz pazemes daļas (saknes, stīgas), kavējot augu augšanu un attīstību un izraisot tā izžūšanu. Pirmie preparāta darbības simptomi (dzeltēšana un vīšana) ir redzami pēc 7-10 dienām no apstrādes. Augu pilnīga izžušana ilgst apmēram 2 - 4 nedēļas. Augsta temperatūra un gaisa mitrums, kā arī spēcīga saules gaisma paātrina produkta darbību. Preparāta optimālas iedarbības nosacījums ir vienmērīga nezāļu pārklāšana ar darba šķidrumu.

Tīrumos pēc ražas novākšanas preparātu var lietot līdz vēlam rudenim, uz zaļām, intensīvi augošām nezālēm. Pēc kultūrauga ražas novākšanas un pirms produkta lietošanas, neveikt nekādas kultivēšanas darbības, it īpaši apkarojot daudzgadīgās nezāles (galvenokārt ložņu vārpātu). Apstrādes laikā ložņu vārpatai jābūt vismaz 10-25 cm augstai un tai jābūt pilnībā attīstījušās vismaz 3-4 lapas. Īsmūža viendīgļlapju nezālēm jābūt vismaz 5 cm augstām, un divdīgļlapju nezālēm jābūt pilnībā attīstījušās divas īstās lapas.

Deva 1.5 l/ha:

Ļoti laba iedarbība (efektivitāte >95%)	sūrene maura (<i>Polygonum aviculare</i>)
Laba iedarbība (efektivitāte (85-94.9%))	izplestā balodene (<i>Atriplex patula</i>), melnā naktene (<i>Solanum nigrum</i>), blusu sūrene (<i>Polygonum persicaria</i>), parastā virza (<i>Stellaria media</i>), parastā gaiļsāre (<i>Echinochloa crus-gali</i>), maura skarene (<i>Poa annua</i>)
Vidēja iedarbība (efektivitāte 70-84.9%)	ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa pastoris</i>), parastā rudzupuķe (<i>Centaurea cyanus</i>), ķeraiņu madara (<i>Galium aparine</i>), sārtā panātre (<i>Lamium purpureum</i>), tīruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>), tīruma naudulis (<i>Thlaspi arvense</i>), tīruma kumelīte (<i>Viola arvensis</i>)

Deva 2.5 l/ha:

Ļoti laba iedarbība (efektivitāte >95%)	sūrene maura (<i>Polygonum aviculare</i>), izplestā balodene (<i>Atriplex patula</i>), melnā naktene (<i>Solanum nigrum</i>), blusu sūrene (<i>Polygonum persicaria</i>), parastā virza (<i>Stellaria media</i>), tīruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>), sīkziedu sīkgalvīte (<i>Galinsoga parviflora</i>), parastā krustaine (<i>Senecio vulgaris</i>)
Laba iedarbība (efektivitāte (85-94.9%))	parastā gaiļsāre (<i>Echinochloa crus-gali</i>), maura skarene (<i>Poa annua</i>), ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa pastoris</i>), parastā rudzupuķe (<i>Centaurea cyanus</i>), ķeraiņu madara (<i>Galium aparine</i>), tīruma kumelīte (<i>Viola arvensis</i>), dārza vējgriķis (<i>Fallopia convolvulus</i>), baltā balanda (<i>Chenopodium album</i>)
Vidēja iedarbība	sārtā panātre (<i>Lamium purpureum</i>), tīruma naudulis (<i>Thlaspi</i>

(efektivitāte 70-84.9%)	<i>arvense</i>), ložņu vārpata (<i>Agropyron repens</i>), ārstniecības kumelīte (<i>Matricaria chamomilla</i>), mieži- sārņaugi
-------------------------	--

Deva 3.0 l/ha:

Ļoti laba iedarbība (efektivitāte >95%)	sūrene maura (<i>Polygonum aviculare</i>), izplestā balodene (<i>Atriplex patula</i>), melnā naktene (<i>Solanum nigrum</i>), blusu sūrene (<i>Polygonum persicaria</i>), parastā virza (<i>Stellaria media</i>), tūruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>), sīkziedu sīkgalvīte (<i>Galinsoga parviflora</i>), parastā krustaine (<i>Senecio vulgaris</i>), ķeraīņu madara (<i>Galium aparine</i>), parastā gaiļsāre (<i>Echinochloa crus-gali</i>), maura skarene (<i>Poa annua</i>),
Laba iedarbība (efektivitāte (85-94.9%))	ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa pastoris</i>), parastā rudzupuķe (<i>Centaurea cyanus</i>), tūruma kumelīte (<i>Viola arvensis</i>), dārza vējgriķis (<i>Fallopia convolvulus</i>), sārtā panātre (<i>Lamium purpureum</i>), tūruma naudulis (<i>Thlaspi arvense</i>), baltā balanda (<i>Chenopodium album</i>), mieži- sārņaugi
Vidēja iedarbība (efektivitāte 70-84.9%)	ložņu vārpata (<i>Agropyron repens</i>), ārstniecības kumelīte (<i>Matricaria chamomilla</i>),

Deva 4.0 l/ha:

Ļoti laba iedarbība (efektivitāte >95%)	parastā virza (<i>Stellaria media</i>), tūruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>), sīkziedu sīkgalvīte (<i>Galinsoga parviflora</i>), parastā krustaine (<i>Senecio vulgaris</i>), parastā gaiļsāre (<i>Echinochloa crus-gali</i>), maura skarene (<i>Poa annua</i>), baltā balanda (<i>Chenopodium album</i>), tūruma kumelīte (<i>Viola arvensis</i>),
Laba iedarbība (efektivitāte (85-94.9%))	sārtā panātre (<i>Lamium purpureum</i>), mieži- sārņaugi, parastā rudzusmilga (<i>Apera spica-venti</i>), skarbā ķērsa (<i>Cardamine hirsuta</i>), lielā nātre (<i>Urtica dioica</i>), ložņu vārpata (<i>Agropyron repens</i>), parastā vībotne (<i>Artemisa vulgaris</i>)
Vidēja iedarbība (efektivitāte 70-84.9%)	ārstniecības kumelīte (<i>Matricaria chamomilla</i>), parastais pelašķis (<i>Achillea millefolium</i>), šaurlapu ceļteka (<i>Plantago lanceolata</i>), ārstniecības pienene (<i>Taraxacum officinale</i>), daudziedu airene (<i>Lolium multiflorum</i>), daudzgadīgā airene (<i>Lolium perenne</i>), parastā skarene (<i>Poa trivialis</i>)

Deva 5.0 – 6.0 l/ha:

Ļoti laba iedarbība (efektivitāte >95%)	parastā virza (<i>Stellaria media</i>), parastā krustaine (<i>Senecio vulgaris</i>), parastā gaiļsāre (<i>Echinochloa crus-gali</i>), maura skarene (<i>Poa annua</i>), baltā balanda (<i>Chenopodium album</i>), tūruma kumelīte (<i>Viola arvensis</i>), parastā rudzusmilga (<i>Apera spica-venti</i>), lielā nātre (<i>Urtica dioica</i>),
Laba iedarbība (efektivitāte (85-94.9%))	skarbā ķērsa (<i>Cardamine hirsuta</i>), ložņu vārpata (<i>Agropyron repens</i>), parastā vībotne (<i>Artemisa vulgaris</i>), daudziedu airene (<i>Lolium multiflorum</i>),
Vidēja iedarbība (efektivitāte 70-84.9%)	parastais pelašķis (<i>Achillea millefolium</i>), šaurlapu ceļteka (<i>Plantago lanceolata</i>), ārstniecības pienene (<i>Taraxacum officinale</i>), daudzgadīgā airene (<i>Lolium perenne</i>), parastā skarene (<i>Poa trivialis</i>)

Lietošanas laiks un devas

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kukurūza	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-3.0	Apsmidzināt pirms kultūrauga sējas vai sējumus pēc sējas, pirms kultūrauga sadīgšanas.	-	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0-6.0	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas, aizsargājot koku lapotni, un stumbrus	-	1
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, ložņu vārpata, labības - sārņaugi	2.5-4.0	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas.	-	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības/ industriālās teritorijas (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0-6.0	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas.	-	1

Piezīmes.

Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei preparāta devai, sākot ar 4.0 l/ha līdz 6.0 l/ha. Aizsargjosla nav jāievēro, ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

Kopējais maksimālais darbīgās vielas glifosāta daudzums nedrīkst pārsniegt 2.88 kg/ha sezonā vienā laukā, lietojot šo vai citu glifosātu saturošu līdzekli.

Darba šķidruma patēriņš: ieteicamais – 100-300 l/ha un optimālais- 100-150 l/ha.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Darba šķidrumu sagatavojiet tieši pirms lietošanas. Pirms iepakojuma atvēršanas labi sakratīt. Pirms darba šķidruma sagatavošanas, precīzi nosakiet tā tilpumu un daudzumu. Preparātu pirms lietošanas rūpīgi sajaukt. Piepildot smidzinātāju, ievērojiet smidzinātāja ražotāja instrukciju. Ja nav instrukcijas, izmērīto preparāta daudzumu pievienojiet smidzinātāja tvertnē, kas daļēji piepildīta ar ūdeni (ar ieslēgtu maisītāju).

Tukšos iepakojumus trīs reizes izskalojiet ar ūdeni un skalošanas ūdeni izlejiet smidzinātāja

tvertnē ar darba šķidrumu, piepildiet ūdeni līdz vajadzīgajam līmenim un rūpīgi samaisiet. Ja smidzinātājs nav aprīkots ar hidraulisko maisītāju, ielieto šķidrumu samaisiet mehāniski.

Smidzinātāja tvertnē sagatavotais darba šķidrums jāizlieto nekavējoties.

Smidzināšanas pārtraukšanas gadījumā, pirms atkārtotas darba uzsākšanas darba šķidrumu smidzinātāja tvertnē rūpīgi samaisiet.

PREPARĀTA LIETOŠANA KOPĀ AR CITIEM LĪDZEKĻIEM VAI PALĪGVIELĀM

Preparāts ir daudzkomponentu kompozīcija, kas satur sastāvdaļas, kas atbalsta aktīvās vielas darbību, tādēļ nav nepieciešams izmantot amonija sulfātu vai citus produktus, kas atbalsta glifosāta darbību.

Preparātam ir izstrādāta formula, tādēļ nav nepieciešams izmantot ārējās palīgvielas, lai uzlabotu preparāta efektivitāti.

ATLIKUŠĀ DARBA ŠĶIDRUMA LIKVIDĒŠANA UN SMIDZINĀTĀJA MAZGĀŠANA

Pēc darba beigām, aparāturu rūpīgi nomazgājiet.

Atlikušo darba šķidrumu un aparātūras mazgāšanai izmantoto ūdeni:

- ja iespējams, pēc iepriekšējās atšķaidīšanas izlietojiet uz apstrādātās virsmas, vai
- neitralizējiet, izmantojot tehniskos risinājumus, kas nodrošina augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu bioloģisku noārdīšanos, vai
- neitralizējiet citā veidā, saskaņā ar atkritumu likuma noteikumiem.

Sakarā ar dažu kultūraugu augu augsto jutību pat pret nelieliem produkta daudzumiem, ir ļoti svarīgi rūpīgi izmazgāt smidzinātāju pēc apstrādes, īpaši pirms lietošanas citos kultūraugos, nekā ieteikts uz etiķetes.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI UN ĪPAŠI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

1. Preparāts nav jālieto:

- pirms nezāļu dīgšanas,
- uz koku un krūmu lapām, dzinumiem un nepārkoksnējušās mizas, jo pastāv risks sabojāt augus,
- uz mitriem augiem,
- pirms paredzamā lietuse (nokrišņi 1 stundas laikā pēc apsmidzināšanas var samazināt apstrādes efektivitāti),
- vēja laikā, kad darba šķidrums vai nonākt uz blakus esošajām teritorijām.

2. Lietojot preparātu nepieļaut:

- darba šķidruma nonākšanu uz blakus esošiem citu kultūraugu sējumiem,
- darba šķidruma pārklāšanos apstrādes un pagrieziņa joslu robežās.

3. Laiks no preparāta izmantošanas brīža līdz brīdim, kurā cilvēki un dzīvnieki var iekļūt apstrādātajā apgabalā (nogaidīšanas periods): neienākt, līdz darba šķidrums nav pilnībā izžuvis uz auga virsmas

REZISTENCES VEIDOŠANĀS RISKA IEROBEŽOŠANA

Lai samazinātu rezistentu nezāļu veidošanās risku:

- stingri ievērojiet augu aizsardzības līdzekļa marķējumā ievērtos norādījumus - lietojiet preparātu ieteiktajā devā un termiņā, kas nodrošina optimālo nezāļu kontroli,
- herbicīds jāizvēlas un apstrāde jāveic ņemot vērā esošo (vai iespējamo) nezāļu daudzumu, dominējošās sugas un kaitīguma sliekšņus,

- izmantojiet herbicīdu (darbīgo vielu) rotāciju ar dažādu iedarbību,
- izmantojiet herbicīdu (darbīgo vielu) maisījumu ar dažādu iedarbību,
- izmantojiet rotācijā un/vai maisījumā herbicīdus, kas darbojas uz vairākiem nezāļu dzīves procesiem (ar dažādu darbības mehānismu),
- izmantojiet herbicīdu ar attiecīgo darbības mehānismu tikai 1 reizi kultūrauga veģetācijas periodā,
- audzēšanas metodes izvēlieties atbilstoši lauka apstākļiem, īpaši nezāļu veidiem un daudzumam,
- izmantojiet dažādas nezāļu kontroles metodes, tostarp kultūraugu rotāciju utt.
- tīriet lauksaimniecības mašīnas, lai novērstu nezāļu pavairošanas materiāla pārvietošanu uz citām kultūrām,
- informējiet atļaujas turētāju, ja nerasniedzat apmierinošus rezultātus,
- lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar konsultantu, atļaujas turētāju vai atļaujas turētāja pārstāvi.

ATKĀROTA SĒJA UN PĒCKULTŪRAS

Uz apstrādāta lauka var sekmīgi audzēt visus augus.

Kultivēšanu, sēšanu vai stādīšanu var sākt pēc 2 dienām, kad laukā tika ierobežotas īsmūža nezāles, un pēc 5 dienām, kad tika ierobežotas daudzgadīgās nezāles. Gadījumā, ja uz lauka vienlaikus tika ierobežotas īsmūža un daudzgadīgās nezāles, apstrādi var veikt pēc 5 dienām.

Laiks no produkta pēdējās lietošanas reizes līdz dienai, kad iespējams veikt sekojošo kultūraugu sēšanu vai stādīšanu: 2-5 dienas.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Pēc preparāta izmantošanas, tara jāizskalo trīs reizes ar ūdeni un skalojamais ūdens jāizmanto darba šķidrums sagatavošanai. Tukšo iepakojumu nedrīkst izmantot atkārtoti. Tas jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības

VIDES AIZSARDZĪBA

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Noplūdes gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālos iepakojumos, tā, lai novērstu saskari ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību, vides piesārņojumu un trešo personu piekļuvi. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +30°C

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies preparāta nepareizas lietošanas vai uzglabāšanas rezultātā. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tādā gadījumā, ja tas tiek iegādāts un uzglabāts noslēgtā, oriģinālā iepakojumā.