

HERBICĪDS
StaraneTM XL

Aizsargiepakojuma marķējums

Preparatīvā forma: suspo-emulsija

Darbīgās vielas: fluroksipirs 100 g/L un florasulams 2.5 g/L

Satur šķīstošo ligroīnu (nafta), vieglo aromātisko un 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Reģistrācijas Nr. 0277

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 4 x 5 L



APSTIPRINU
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļas vadītāja
R. Čudere
20.10.2017. oktobrī

Uzmanību

H315 Kairina ādu.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesāņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesāņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana: Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +30°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs:

Corteva Agriscience Denmark A/S

Langebrogade 1,

DK-1411 Kopenhāgena, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā:

Corteva Agriscience, Tel. +371 2897 5155, www.corteva.lv

TM Trademarks of Corteva, Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners

SANĒMTS Nr. 840
Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļa
20.10.2017. g. 26. oktobrī

Iepakojuma marķējums

HERBICĪDS
StaraneTM XL

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu pasējas, ganībās un stiebrzāļu sējumos sēklai.

Preparatīvā forma: suspo-emulsija

Darbīgās vielas: fluoksipirs 100 g/L un florasulams 2,5 g/L

Satur šķīstošo ligroīnu (nafta), vieglo aromātisko un 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Reģistrācijas Nr. 0277

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 5 L



Uzmanību

H315 Kairina ādu.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P501 Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesāņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana: Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +30°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs:

Corteva Agriscience Denmark A/S
Langebrogade 1,
DK-1411 Kopenhāgena, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā:

Corteva Agriscience, Tel. +371 2897 5155, www.corteva.lv

TM Trademarks of Corteva, Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners

Pirmā medicīniskā palīdzība:

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 min.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 min.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlams ārstu konsultācija. Uzrādiet attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saīdēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, respiratoru, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

PIELIETOŠANAS NORĀDĪJUMI**Tehniskā informācija**

Starane XL ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras miežu, vasaras kviešu un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu pasējas, ganībās un stiebrzāļu sējumos sēklai.

Iedarbības veids un spektrs

Starane XL satur divas darbīgās vielas: fluroksipiru 100 g/L un florasulamu 2,5 g/L. Florasulams inhibē acetolaktāta sintēzi, kas piedalās svarīgu aminoskābju sintēzē augos, bet fluroksipiram ir auksīnu preparātu iedarbības efekts – izraisa nekontrolētu šūnu augšanu pret to jutīgos augos. Abu darbīgo vielu iedarbība rada spēcīgu efektu pret nezālēm.

Starane XL efektivitāte ziemāju graudaugos.

	Starane XL, deva 1.0 l/ha	Starane XL, deva 1.2 l/ha
	AS 20-29	AS 30-45
ļoti laba iedarbība (efektivitāte > 95%)	parastā virza (<i>Stelaria media</i>), ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), tīruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>), tīruma neaizmirstule (<i>Myosotis</i> ,	ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), zilā rudzupuķe (<i>Centaurea cyanus</i>), dārza vējgriķis (<i>Polygonum convolvulus</i>), parastā virza (<i>Stelaria media</i>), parastā salātene (<i>Lapsana communis</i>)
laba iedarbība (efektivitāte no 85 līdz 94.9%)	zilā rudzupuķe (<i>Centaurea cyanus</i>), ķeraīņu madara (<i>Galium aprine</i>), zīda magone (<i>Papaver rhoeas</i>) tīruma pērkone (<i>Raphanus raphanistrum</i>), asais aklis (<i>Galeopsis tetrahit</i>), melnā naktene (<i>Solanum nigrum</i>)	tīruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>), ķeraīņu madara (<i>Galium aprine</i>), zīda magone (<i>Papaver rhoeas</i>) tīruma pērkone (<i>Raphanus raphanistrum</i>), asais aklis (<i>Galeopsis tetrahit</i>), melnā naktene (<i>Solanum nigrum</i>) parastā krustaine (<i>Senecio vulgaris</i>) (dīgļlapu stadijā)
vidēja iedarbība (efektivitāte no 70 līdz 84.9%)	rapsis –sārņaugš (<i>Brassica napus</i>), parastā krustaine (<i>Senecio vulgaris</i>), mīkstpienes (<i>Sonchus spp.</i>)	rapsis –sārņaugš (<i>Brassica napus</i>), tīruma neaizmirstulīte (<i>Myosotis arvensis</i>), tīruma zvēre (<i>Sinapis arvensis</i>), mīkstpienes (<i>Sonchus spp.</i>) sīkā gandrene (<i>Geranium pusillum</i>)

Starane XL efektivitāte vasarāju graudaugos.

	Starane XL, deva 0.8 l/ha AS 20-29	Starane XL, deva 1.0 l/ha AS 30-45
ļoti laba iedarbība (efektivitāte >95%)	ķeraiņu madara (<i>Galium aparine</i>), ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), tīruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>), blusu sūrene (<i>Polygonum persicaria</i>),	parastā virza (<i>Stellaria media</i>), tīruma zvēre (<i>Sinapis arvensis</i>),
laba iedarbība (efektivitāte no 85 līdz 94.9%)	maura sūrene (<i>Polygonum aviculare</i>), dārza vējgriķis (<i>Polygonum convolvulus</i>), tīruma pērkone (<i>Raphanus raphanistrum</i>), parastā virza (<i>Stellaria media</i>), melnā naktene (<i>Solanum nigrum</i>)	ķeraiņu madara (<i>Galium aparine</i>), tīruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>), dārza vējgriķis (<i>Polygonum convolvulus</i>) tīruma pērkone (<i>Raphanus raphanistrum</i>), melnā naktene (<i>Solanum nigrum</i>)
vidēja iedarbība (efektivitāte no 70 līdz 84.9%)	parastā krustaine (<i>Senecio vulgaris</i>), mīkstpienes (<i>Sonchus spp.</i>), panātres (<i>Lamium spp.</i>), akļi (<i>Galeopsis spp.</i>)	parastā krustaine (<i>Senecio vulgaris</i>), mīkstpienes <i>Sonchus spp.</i> , panātres (<i>Lamium spp.</i>)

Starane XL efektivitāte ganībās un stiebrzāļu sēklu laukos.

	Starane XL, deva 1.5-1.8 l/ha AS 20-45
ļoti laba iedarbība (efektivitāte >95%)	parastā virza (<i>Stellaria media</i>), ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), zilā rudzupuķe (<i>Centaurea cyanus</i>), dārza vējgriķis (<i>Polygonum convolvulus</i>), parastā krustaine (<i>Senecio vulgaris</i>), tīruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>), melnā naktene (<i>Solanum nigrum</i>), parastā salātene (<i>Lapsana communis</i>)
laba iedarbība (efektivitāte no 85 līdz 94.9%)	akļi (<i>Galeopsis spp.</i>), ķeraiņu madara (<i>Galium aparine</i>), tīruma neaizmirstulīte (<i>Myosotis arvensis</i>), tīruma pērkone (<i>Raphanus raphanistrum</i>), gandrenes (<i>Geranium spp.</i>)
vidēja iedarbība (efektivitāte no 70 līdz 84.9%)	mīkstpienes (<i>Sonchus spp.</i>), baltā balanda (<i>Chenopodium album</i>), ārstniecības pienene (<i>Taraxacum officinalis</i>), rapsis-sārņaugš (<i>Brassica napus</i>), skābenes (<i>Rumex spp.</i>)

Apstrādes laiks un kultūraugi

Starane XL ir salīdzinoši neatkarīgs no temperatūras apstrādes laikā. Apstrāde var tikt veikta, kad gaisa temperatūra ir sasniegusi +5°C. Ziemāju labības un zālaugu sējumi var tikt apstrādāti pavasarī uzreiz pēc veģetācijas atsākšanās.

Lietošanas laiks un devas

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/bez	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.8-1.2	Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)	-	1

stiebrzāļu pasējas					
Vasaras kvieši, vasaras mieži ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.8-1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45)	-	1
Auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.8-1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	-	1
Ganības (ierīkošanas gadā)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45)	-	1
Ganības (2. gada un vecākas)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5-1.8	Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45)	7	1
Stiebrzāles* (sēklai, sējas gadā)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45)	-	1
Stiebrzāles* (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5-1.8	Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45)	-	1

***Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašinājums veikts saskaņā ar Regulas (ES) 1107/2009 51. pantu.

Atbildība.

Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības joma paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem vai ražas zudumiem.

Starane XL nedrīkst lietot sējumos ar āboliņa, lucernas vai pākšaugu pasēju.

Nogaidīšanas laiks – ganībās (2. gada un vecākās) – 7 dienas.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena reize.

Laika apstākļi apstrādei

Starane XL ir salīdzinoši neatkarīgs no gaisa relatīvā mitruma, respektīvi, vienāds efekts tiks sasniegts smidzināšanu veicot gan dienas vidū, gan rīta stundās. Apstrāde ar **Starane XL** netiek rekomendēta, ja apstrādājama kultūraugs cieš no stresa, ko radījis sausums, pārmitra augsne vai ļoti augsta gaisa temperatūra.

Smidzināšanas tehnika un ūdens daudzums

Ieteicams **Starane XL** izsmidzināšanai lietot Hardi ISO F-02-110 vai F-03-110 sprauslas, spiedienu 2,5-3 atmosfēras, darba ātrumu 8 km/h. Rekomendējams ūdens daudzums uz vienu hektāru ir 100 – 300 litri.

Darba šķidruma sagatavošana.

Piepildiet smidzinātāja tvertni līdz pusei ar ūdeni, ieslēdziet maisītāju, pievienojiet vajadzīgo **Starane XL** daudzumu un nepārtraucot maisīšanu, piepildiet tvertni ar atlikušo ūdens daudzumu. Izmantojiet tikai tīru ūdeni darba šķidruma sagatavošanai.

Lietus noturība

Starane XL ir lietus noturīgs jau 1 stundu pēc izsmidzināšanas.

Tvertnes maisījumi (savienojamība)

Starane XL var izmantot tvertnes maisījumos ar lielāko daļu herbicīdiem, fungicīdiem un augu augšanas regulatoriem. Nav ieteicams veidot tvertnes maisījumus ar fenoksaprop-P-etilu un klodinafopu saturošiem preparātiem, jo to efektivitāte pret viendīgļlapju nezālēm var samazināties, sakarā ar florasulama klātbūtni maisījumā. Neskaidrību gadījumā kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā.

Augsnes tips

Starane XL tiek uzņemts caur lapām, tāpēc var tikt lietots visu tipu augsnēs.

Pēcaugi / Atkārtota sēja

Kultūraugi, kurus var sēt tajā pašā kalendārajā gadā pēc **Starane XL** lietošanas: ziemāju graudaugi, ziemas rapsis, stiebrzāles. Pēcaugu izvēlē nākamajā gadā pēc **Starane XL** lietošanas nav ierobežojumu.

Ja sala rezultātā ir cietis ar **Starane XL** apstrādātais kultūraugs, tā vietā drīkst pārsēt graudaugus, kukurūzu un aīrenes.

Augu pēcplaujas atliekas

Augu pēcplaujas atliekas no kultūraugiem, apstrādātiem ar **Starane XL**, nedrīkst izmantot siltumnīcās un kompostos.

Pretrezistences stratēģija

Starane XL satur darbīgo vielu florasulams, kas iedarbojas kā acetolaktāta sintēzes (ALS) inhibitors (B grupas preparāts, pēc HRAC), un fluroksipirs, kas pieder pie organisko skābju atvasinājumiem (O grupas preparāts, pēc HRAC). Tā kā **Starane XL** satur divas darbīgās vielas ar atšķirīgiem iedarbības viediem, nezāļu rezistences izveidošanās risks ir samazināts. Tomēr jāņem vērā, ka produkta sastāvā esošajam florasulam kā ALS inhibitoram pastāv risks, ka dažas nezāļu sugas var būt vai arī laika gaitā var izveidot rezistenci pret šī iedarbības veida herbicīdiem. Atkārtota herbicīdu lietošana ar

vienu un to pašu iedarbības mehānismu vienā un tai pašā laukā pret vienām un tām pašām nezāļu sugām var radīt rezistentas nezāļu populācijas izveidošanos. Lai novērstu vai aizkavētu rezistences izveidošanos, rekomendējam lietot herbicīdus ar atšķirīgiem iedarbības mehānismiem vai arī veidot tvertnes maisījumus, kuros divas vai vairākas darbīgās vielas iedarbojas uz vienu un to pašu nezāļu sugu. Tāpat tiek rekomendēts augsekā iekļaut gan vasarāju, gar arī ziemāju kultūraugus. Šīs rekomendācijas īpaši būtu jāņem vērā saimniecībām, kurās tiek lietota kāda no minimālās augšnes apstrādes tehnoloģijām. Esiet uzmanīgi, ja preparāta iedarbības efektivitāte samazinās (kas citos gadījumos bijusi plānotā līmenī), jo tas var norādīt uz rezistences izveidošanās sākumu.

Smidzinātāja tīrīšana

Smidzinātāja tīrīšana ar uzstādītām tvertnes mazgāšanas sprauslām

PIEZĪME. Atcerieties smidzinātāju iztukšot pilnīgi pēc katras, smidzināšanas/mazgāšanas reizes. Aktivizējiet visus vārstus. Paaugstiniet spiedienu līdz nepieciešamajam līmenim.

1. Iztukšojiet smidzinātāju uz lauka pilnībā.
2. Uzreiz pēc smidzināšanas beigām izmazgājiet smidzinātāju ar tīru ūdeni, kā arī nomazgājiet to no ārpuses. Iztukšojiet smidzinātāju, izsmidzinot skalošanas ūdeni caur sprauslām. Skalošanas ūdeni ieteicams izsmidzināt uz tikko apsmidzinātā lauka.
3. Piepildiet smidzinātāja tvertni ar ūdeni – 10-15% no tvertnes ietilpības (100-150 litrus ūdens 1000 litru ietilpības tvertnē) un pievienojiet 0,5 litrus All Clear Extra vai līdzīgu produktu uz 100 litriem ūdens. Izsmidziniet nelielu daudzumu šķidruma caur sprauslām, lai tās samitrinātu. Ieslēdziet maisītāju un tvertnes mazgāšanas sprauslas uz vismaz 15 minūtēm. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā.
4. Sprauslas un filtri jānoņem un jāizmazgā ar ūdeni, kuram pievienots All Clear Extra 50 ml uz 10 litriem ūdens.
5. Skalojiet tvertni ar tīru ūdeni 5 minūtes. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā.

Lietojot tvertnes mazgāšanas sprauslas, 2. punktā minētās darbībās vēlams sākt uz lauka. Ja ir pietiekošs tīra ūdens daudzums, uz lauka var veikt arī 3. punktā minētos pasākumus. Tvertnes mazgāšanu var veikt pa ceļam uz mājām. Mazgāšanas un skalošanas ūdeni jānovirza vietās, kur tie nevar nodarīt kaitējumu apkārtējai videi un nevar nonākt gruntsūdeņos vai virszemes ūdens tilpnēs.

Smidzinātāja tīrīšana bez uzstādītām tvertnes mazgāšanas sprauslām

Atšķirībā no iepriekš 3. punktā minētā ūdens daudzuma - 10-15% no tvertnes ietilpības - šādā gadījumā tvertne ir pilnībā jāpiepilda ar ūdeni. Jārūpējas, lai skalošanas ūdens nonāktu kontaktā ar visu tvertnes iekšējo virsmu.

VIDES AIZSARDZĪBA

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz + 30°C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

TUKŠĀ TARA

Pēc preparāta izmantošanas tukšais iepakojums 3 reizes jāizskalo ar tīru ūdeni. Skalojamais ūdens jāizmanto darba šķidruma gatavošanai. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Iepakojumu nedrīkst lietot atkārtoti. Tas jāuzglabā speciāli iekārtotā vietā, un to likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Lietošanas instrukcija izstrādāta, ņemot vērā jaunākās zinātnes atziņas. Tomēr preparāta iedarbība ir atkarīga no dažādiem faktoriem, piemēram, preparāta uzglabāšanas, šķirņu īpatnībām, laika apstākļiem, preparātu maisījumiem, smidzinātāja un citiem faktoriem. Šie faktori, kā arī pielietošana, nav atkarīga no preparāta izgatavotāja vai tirdzniecības partnera, tādēļ nesam atbildību par preparāta īpašībām tikai tā piegādes brīdī.