

Zoral™
Herbicīds

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts (EC)

Darbīgās vielas: metil-halauksifēns 4,82 g/l, florasulams 3,85 g/l, pinoksadēns 45 g/l

Reģistrācijas Nr.: 0933

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 10x1 L, 6x2 L, 6x3 L, 4x5L, 2x10 L, 1x15 L, 1x20 L



Bīstami

EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

EUU401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

P260 Neieelpot izgarojumus/smīdzinājumu.

P264 Pēc apstrādes rūpīgi nomazgāt rokas ar lielu daudzumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes /acu aizsargus/sejas aizsargus.

P301+P310+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

P403+P233 Glabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni stingri noslēgt.

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

SPe3 Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, nepieciešams ievērot aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjoslu platums līdz blakus laukam un /vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei skatīt lietošanas instrukcijā.

Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana: Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs: Corteva Agriscience Denmark A/S A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Kopenhāgena K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience Tel. +371 2897 5155, www.corteva.lv

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

Zoral™
Herbicides

Herbicīds viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai pēc sadīgšanas ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu un vasaras kviešu, vasaras miežu sējumos.

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts (EC)

Darbīgās vielas: metil-halauksifēns 4,82 g/l, florasulams 3,85 g/l, pinoksadēns 45 g/l

Reģistrācijas Nr.: 0933

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 1 L, 2 L, 3 L, 5 L, 10 L, 15 L, 20 L



Bīstami

EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

EUU401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

P260 Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

P264 Pēc apstrādes rūpīgi nomazgāt rokas ar lielu daudzumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P301+P310+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

P403+P233 Glabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni stingri noslēgt.

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

SPe3 Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, nepieciešams ievērot aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjoslu platums līdz blakus laukam un /vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei skatīt lietošanas instrukcijā.

Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana: Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gads no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs: Corteva Agriscience Denmark A/S A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Kopenhāgena K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience Tel. +371 2897 5155, www.corteva.lv

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlams ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saīdēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473

PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Zoral ir herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai pēc sadīgšanas ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu un vasaras kviešu, vasaras miežu sējumos.

Zoral iedarbojas caur lapām uz tādām nezālēm kā parastā rudzusmilga (*Apera spica-venti*), vējauzas (*Avena sp.*), parastā rudzupuķe (*Centaurea cyanus*), ķeraīņu madara (*Galium aparine*), kumelītes (*Matricaria sp.*), zīda magone (*Papaver rhoeas*) un parastā virza (*Stellaria media*).

Zoral efektivitāte nezāļu ierobežošanā ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu sējumos

Nezāles	Deva 1.3 l/ha
Peļastīšu lapsaste (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	XXX
Parastā rudzusmilga (<i>Apera spica-venti</i>)	XXXX
Auzas (<i>Avena sp.</i>)	XXXX
Daudzziedu airene (<i>Lolium multiflorum</i>)	XXXX
Ganību airene (<i>Lolium perenne</i>)	XXXX
Rapsis (<i>Brassica napus</i>)	XXXX
Ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	XXXX
Parastā rudzupuķe (<i>Centaurea cyanus</i>)	XXXX
Ķeraīņu madara (<i>Galium aparine</i>)	XXXX
Šķeltā gandrene (<i>Geranium dissectum</i>)	-
Sārtā panātre (<i>Lamium purpureum</i>)	XXXX
Ārstniecības kumelīte (<i>Matricaria chamomilla</i>)	XXX
Tiruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>)	XXXX
Zīda magone (<i>Papaver rhoeas</i>)	XXXX
Parastā virza (<i>Stellaria media</i>)	XXXX

XXXX – ļoti labi ierobežo – efektivitāte 95 – 100%

XXX – labi ierobežo – efektivitāte 85 – 94.9%

XX – vidēji ierobežo – efektivitāte 70-84.9 %

X – vāji ierobežo – efektivitāte < 69.9%

- nav dati

Zoral efektivitāte nezāļu ierobežošanā vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos

Nezāles	Deva 0.7 l/ha	Deva 1 l/ha
Vējauza (<i>Avena fatua</i>)	XXX	XXXX
Baltā balanda (<i>Chenopodium album</i>)	-	XXX
Madaras (<i>Galium sp.</i>)	-	XXXX
Dārza vējgriķis (<i>Fallopia convolvulus</i>)	-	XXXX
Tiruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>)	-	XXXX

Maura sūrene (<i>Polygonum aviculare</i>)	-	XXX
---	---	-----

XXXX – ļoti labi ierobežo – efektivitāte 95 – 100%

XXX – labi ierobežo – efektivitāte 85 – 94.9%

XX – vidēji ierobežo – efektivitāte 70-84.9 %

X – vāji ierobežo – efektivitāte < 69.9%

- nav dati

IEDARBĪBAS VEIDS

Zoral satur 3 darbīgās vielas Arylex Activedarbīgo vielu (metil-halauksifēns), florasulamu un pinoksadēnu. Metil-halauksifēns pieder sintētisko auku herbicīdu klasei, florasulams ir triazolopirimidīnu sulfonilīdu atvasinājums, pinoksadēns pieder ķīmiskajai klasei – fenilpirazolīniem. Zoral satur palīgvielu - klovintocet-meksilu (mazina herbicīda ietekmi uz kultūraugu).

Zoral tiek uzņemts ar lapām. Uzņēmīgām sugām simptomi redzami pēc pāris dienām vai nedēļām, atkarībā no sugas, pilns iedarbības efekts redzams pēc 4-6 nedēļām.

LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI

Ieteicams apstrādi ar Zoral veikt nezāļu attīstības sākumā, aktīvas augšanas laikā. Gaisa temperatūrai apstrādes laikā nav ieteicams pārsniegt +25°C. Apstrādi ar produktu neveikt laikā, kad kultūraugs cieš no stresa, kas radies pēc salnām, ilgstoša sausuma, pārlietu liela mitruma, barības vielu trūkuma, slimību vai kaitēkļu radītu bojājumu rezultātā. Neliela fitotoksitāte var parādīties (hloroze, augšanas aizkavēšanās un krāsas maiņa), bet šie simptomi ir pārejoši un neietekmēs ražu vai tās kvalitāti.

LIETOŠANAS DEVAS

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l/ha	Ieteicamā darba šķīduma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.3		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.7		Apsmidzināt sējumus graudaugu cerošanas fāzē (AS 21-29)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)		

AUGSNE

Zoral var lietot visos augsnes tipos.

LIETUS NOTURĪBA

Nepieciešamais bezlietus periods pēc Zoral lietošanas ir viena stunda.

PĒCKULTŪRAS

Ja apstrāde ar Zoral veikta līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 39), un deva nepārsniedz 1.3 l/ha, var sēt jebkuru kultūraugu. Tā kā Zoral sadalīšanās ātrums ir atkarīgs no augsnes mitruma un temperatūras, tad ir ieteicams veikt aršanu pirms nākošo kultūraugu sējas.

PĀRSĒJA

Vismaz 6 nedēļas pēc apstrādes ar Zoral var sēt vasarāju graudaugus, nakteņu dzimtas kultūraugus, pākšaugus un kukurūzu, veicot minimālu augsnes apstrādi.

BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet Zoral auzām vai kultūraugiem ar tauriņziežu pasēju (āboliņš utt.) vai zālāja.

SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS DAUDZUMS

Zoral izsmidzināšanai var izmantot jebkura tipa ar traktoru piekabināmai hidraulisko smidzinātājus, kas ir labā darba kārtībā un kalibrēti saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Darba spiediens pēc iespējas zemāks un smidzinātāja augstumu pielāgot sprauslām un kultūraugu augstumam, lai nodrošinātu kvalitatīvu apstrādi. Izmantot sprauslas, kas paredzētas herbicīdu lietošanai.

Rekomendējamais darba šķidruma patēriņš uz hektāru ir 100-400 litri. Mazs ūdens tilpums izmantojams tikai nelielām nezālēm un graudaugiem attīstības stadijas sākumā.

AIZSARGJOSLAS PLATUMS LĪDZ BLAKUS LAUKAM UN /VAI LAUKSAIMNIECĪBĀ NEIZMANTOJAMAI ZEMEI

Kultūraugs	Deva l/ha	Smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas			
		Netiek lietotas	50%	75%	90%
Kultūraugu sējumi	0.7	10 m	5 m	-	0 m
	1.0	15 m	10 m	5 m	-
	1.3	20 m	10 m	5 m	-

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Zoral var izmantot uz traktora uzliekamai miglošanas iekārtai. To var pievienot tvertnes augšpusē vai caur indukcijas traukiem. Pievienojiet atbilstošu Zoral daudzumu tīram ūdenim līdz pusei piepildītā smidzinātāja tvertnē, rūpīgi samaisiet un pievienojiet virsmas aktīvo vielu un atlikušo ūdeni. Darba šķidrums jāmaisā arī smidzināšanas laikā, lai tas visu laiku būtu viendabīgs.

Izmantojot darba šķidruma sagatavošanas tvertni

Lietojot darba šķidruma sagatavošanas tvertni, vispirms piepildiet to līdz pusei ar ūdeni, tad pievienojiet vajadzīgo Zoral daudzumu, kurš pēc tam tiek iesūkts smidzinātāja tvertnē, kamēr tīrais ūdens tiek pievienots darba šķidruma sagatavošanas tvertnē. Atkārtot procedūru ar apakšējā vārsta atvēršanu/aizvēršanu, kamēr vairs nav redzamas Zoral atliekas tvertnē.

SMIDZINĀTĀJA TĪRĪŠANA

Lai novērstu nākošo apstrādājamo kultūraugu, izņemot graudaugus, iespējamus bojājumus, smidzināšanas iekārta pēc lietošanas ir rūpīgi jānomazgā gan no iekšpuses, gan ārpusēs.

1. Iztukšojiet smidzinātāju uz lauka pilnībā. Uzreiz pēc smidzināšanas beigām nomazgājiet to no ārpusēs.
2. Izskalojiet smidzinātāja tvertni ar tīru ūdeni un iztukšojiet to, izsmidzinot skalošanas ūdeni caur sprauslām. Skalošanas ūdeni ieteicams izsmidzināt uz tikko apsmidzinātā lauka. Iztukšojiet smidzinātāju pilnībā.

3. Piepildiet smidzinātāja tvertni ar ūdeni līdz pusei un pievienojiet rekomendēto daudzumu All Clear* Extra. Samaisiet un izsmidziniet nelielu daudzumu šķidruma caur sprauslām. Piepildiet tvertni pilnu ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju uz 15 minūtēm. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā. Iztukšojiet smidzinātāju pilnībā.
4. Sprauslas un filtri jānoņem un jāizmazgā ar ūdeni, kuram pievienots All Clear Extra* 50 ml uz 10 litriem ūdens.
5. Skalojiet tvertni ar tīru ūdeni. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā. Iztukšojiet smidzinātāju pilnībā.
6. Mazgāšanas un skalošanas ūdeņi jānovirza vietās, kur tie nevar nodarīt kaitējumu apkārtējai videi un nevar nonākt gruntsūdeņos vai virszemes ūdens tilpnēs. Neizsmidzināt uz jutīgiem kultūraugiem vai tīrumos, kur tos paredzēts audzēt.

Piezīme: Ja tvertni nav iespējams iztukšot pilnībā, 3. punktā, minētās darbība ir jāatkārto, pirms veic 4. punktā minētos pasākumus.

SMIDZINĀTĀJU TĪRĪŠANA NO ĀRPUSES

Smidzinātāja un traktora tīrīšana ir jāveic vai nu uz apstrādātās platības vai arī jāizmanto speciāls tīrīšanas laukums, kurā ir ierīkots atsevišķs atlikumu savākšanas konteiners. Tīrot smidzinātāju uz lauka, smidzinātājam ir jābūt aprīkotam ar nepieciešamajām mazgāšanas iekārtām, kā arī mazgājamā ūdens daudzumam jābūt pietiekamam.

PRETREZISTENCES STRATĒGIJA

Produkts	Tips	Aktīvā viela	Pēc HRAC klasifikācijas	Rezistences risks
Zoral	herbicīds	pinoksadēns	1 (A)	Augsts
		metil-halauksifēns	4 (O)	Zems
		florasulams	2 (B)	Augsts

Zoral satur trīs aktīvās sastāvdaļas: pinoksadēnu viendīgļlapju apkarošanai, metil-halauksifēnu un florasulamu, kas ierobežo divdīgļlapju nezāles ar atšķirīgiem iedarbības veidiem. Tāpēc divdīgļlapju nezāļu sugām ir samazināts rezistences veidošanās risks.

Rezistences vadības stratēģija

Jāizmanto labas augsnes apstrādes metodes, piemēram, aršana, novēlotai rudens sēšanai, izmantot lielāku sēklu daudzumu un konkurētspējīgas šķirnes. Skatiet vietējās rezistences vadlīnijas.

- Lietojiet herbicīdus optimālā to lietošanas laikā un piemērotos vides apstākļos.
- Nelietojiet Zoral vienai un tai pašai nezāļu populācijai vairāk nekā vienu reizi gadā.
- Izmantojiet herbicīdu maisījumus ar dažādiem iedarbības veidiem ar pilnām ieteicamajām devām, lai maksimāli palielinātu kontroli un samazinātu sēklu veidošanos.

TUKŠĀ TARA

Iepakojumu pēc iztukšošanas tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes un skalojamo ūdeni izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Iepakojumu nedrīkst lietot atkārtoti. Tas jāuzglabā speciāli iekārtotā vietā un to likvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBA

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Ja tiek lietots augu aizsardzības līdzeklis un lietotas smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, aizsargjoslas lielumu līdz blakus laukam un vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei skatīt "AIZSARGJOSLAS PLATUMS LĪDZ BLAKUS LAUKAM UN /VAI LAUKSAIMNIECĪBĀ NEIZMANTOJAMAI ZEMEI" tabulā." Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un

ceļiem. Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Visi mūsu piegādātie produkti ir augstas kvalitātes un mēs esam pārliecināti par to piemērotību lietošanai, taču, tā kā mēs nevaram nodrošināt kontroli pār uzglabāšanu, transportēšanu, jaukšanu un lietošanu, kā arī par laika apstākļiem pirms apstrādes, apstrādes brīdī un pēc apstrādes, kas var ietekmēt produkta iedarbības efektivitāti, visi nosacījumi un garantijas, likumā noteiktās vai citas, attiecībā uz mūsu produkta kvalitāti vai piemērotību jebkādi tā lietošanai, nav ietverti. Ne mēs, ne mūsu tirdzniecības partneri neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies produkta nepareizas uzglabāšanas, transportēšanas vai lietošanas rezultātā. Šos nosacījumus nevar mainīt ne mūsu darbinieki, ne pārstāvji, neatkarīgi no tā, vai tie pārrauga vai piedalās produktu lietošanā.

*Registered trademark – FMC Agricultural Solutions